

## BULETIN DE AVERTIZARE

NR 54 DIN 24.06.2015

Conditiiile climatice din ultimile zile au favorizat aparitia si dezvoltarea bolilor : *Bacterioze comune - Arsura comuna (Xanthomonas campestris pv. phaseoli), Antracnoza (Colletotrichum lindemuthianum).*

care pot cauza pierderi importante la culturile : **FASOLE**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **T2** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: **Arsura : GA - 10% frunze, Antracnoza : GA - 5% frunze**

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

**Funguran 50 WP PU conc. 0,25% pentru arsura**

**Merpan 50 WP conc. 0,25% pentru antracnoza**

**Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea « Agricultura - Fitosanitar - baza de date Pestexpert ».**

Perioada optima de tratament : **ianie – decada 3.2015**

Fenofaza culturii : **inainte de inflorit**

Alte recomandari :Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor. Se vor respecta prevederile O.G.4/1995 modificata si aprobata prin L 85/1995, precum si OG 400/2007 modificata si aprobata prin L 28/2009.

Statia de prognoza si avertizare Piatra Neamt

## BULETIN DE AVERTIZARE

NR 55 DIN 24.06.2015

Conditiiile climatice din ultimile zile au favorizat aparitia si dezvoltarea bolii / daunatorului : **Mana tomatelor (Phytophthora infestans), Patarea alba a frunzelor (Septoria lycopersici), Patarea frunzelor si basicarea fructelor (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), Patarea bruna (Cladosporium fulvum), Putregaiul bazei tulpinii (Didymella lycopersici), Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata).**

care pot cauza pierderi importante la culturile : **TOMATE**

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **T2 și 3** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: **Mana, Patarea alba, Patarea bruna : GA -10% frunze, Patarea frunzelor si basicarea fructelor : frecv - 5% fructe atacate, Putregaiul bazei tulpinii : frecv - 3% plante atacate, Gandacul din Colorado : frecv – 5% plante atacate.**

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

**Bravo 500 SC cantit. 1,5 - 2,0 l/ha și Fastac 10 EC cantit. 0,1l/ha sau**

**Dithane Neotec 75 WG cantit. 2,0 - 2,5 kg/ha și Alverde cantit. 0,25 l/ha**

**Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea « Agricultura - Fitosanitar - baza de date Pestexpert ».**

Perioada optima de tratament : **ianie – decada 3, iulie - decada 1. 2015**

Fenofaza culturii : **inflorire – fructificare**

Alte recomandari: **tratamentul se repata la 8-10 zile**

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, si cele de protectie a albinelor si animalelor. **Se vor respecta prevederile O.G. 4/1995 modificata si aprobata prin L 85/1995, precum si O.G. 41/2007 modificata si aprobata prin L 28/2009.**

Statia de prognoza si avertizare Piatra Neamt

## BULETIN DE AVERTIZARE

NR 56 DIN 24. 06. 2015

Conditiiile climatice din ultimile zile au favorizat aparitia si dezvoltarea bolii / daunatorului: *Cercosporioza sfeclei (Cercospora beticola)*, *Fainare (Erysiphe betae)*, *Buha verzei (Mamestra sp.)*, *Buha gama (Plusia sp.)*

care pot cauza pierderi importante la culturile : **SFECLA DE ZAHAR**

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **T2** pe parcelele pe care s-a depasit pragul economic de daunare: *Cercosporioza* , *Fainare* : **GA - 10% frunze**, **Omizi defoliatoare** : **5-7 larve/100 plante**

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

**Score 250 EC cantit. 0,3 l/ha** † **Fastac 10 EC cantit. 0,1 l/ha** sau

**Tango Super cant. 1,0 l/ha** † **Novadim progress cantit. 0,2 l/ha**

**Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea « Agricultura - Fitosanitar - baza de date Pestexpert ».**

Perioada optima de tratament : **iunie – decada 3, iulie – decada 1. 2015**

Fenofaza culturii :

Alte recomandari:

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, si cele de protectie a albinelor si animalelor. **Se vor respecta prevederile O.G. 4/1995 modificata si aprobata prin L 85/1995, precum si O.G. 41/2007 modificata si aprobata prin L 28/2009.**

Statia de prognoza si avertizare Piatra Neamt

## BULETIN DE AVERTIZARE

NR 57 DIN 24. 06. 2015

Conditiiile climatice din ultimile zile au favorizat aparitia si dezvoltarea bolilor: *Mana cartofului (Phytophthora infestans)*, *Patarea bruna a frunzelor (Alternaria porri f.sp. solani)*.

care pot cauza pierderi importante la culturile : **CARTOF**

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **T3** pe parcelele pe care s-a depasit pragul economic de daunare: *Mana*, *Patate bruna* : **GA - 10% frunze**

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

**Antracol 750 WP cantit. 1,5–2,5 kg/ha** sau

**Electis 75 WG cantit. 1,5–1,8 kg/ha** sau

**Equation pro cantit. 0,4 kg/ha (mana)** sau

**Infinito 687,5 SC cantit. 1,4 l/ha (mana)** sau

**Melody compact 49 WG cantit. 2,0 kg/ha (mana)**

**Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea « Agricultura - Fitosanitar - baza de date Pestexpert ».**

Perioada optima de tratament : **iunie – decada 3, iulie – decada 1. 2015**

Fenofaza culturii :

Alte recomandari:

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, si cele de protectie a albinelor si animalelor. **Se vor respecta prevederile O.G. 4/1995 modificata si aprobata prin L 85/1995, precum si O.G. 41/2007 modificata si aprobata prin L 28/2009.**

Statia de prognoza si avertizare Piatra Neamt

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA  
OFICIUL FITOSANITAR NEAMT

## BULETIN DE AVERTIZARE

NR 58 DIN 24.06.2015

Conditiiile climatice din ultimile zile au favorizat aparitia si dezvoltarea bolii: *Mana cepei (Peronospora destructor)*, care poate cauza pierderi importante la culturile : **CEAPA**

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **T3** pe parcelele pe care s-a depasit pragul economic de daunare: **Mana : GA - 5% frunze**

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

**Acrobat MZ 90/600 WP conc. 0,2% (2,0 kg/ha) sau**

**Odeon 820 WDG conc. 0,12% (1,2 kg/ha) sau**

**Ridomil gold MZ 68 WG conc. 0.25% (2,5 kg/ha)**

**Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea « Agricultura - Fitosanitar - baza de date Pestexpert ».**

Perioada optima de tratament : **iunie – decada 3. 2015**

Fenofaza culturii :

Alte recomandari: **In solutia de stropit se adauga ARACET - 0,2%. La ceapa de stufat se va respecta intervalul de pauza pana la recoltare.**

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, si cele de protectie a albinelor si animalelor. **Se vor respecta prevederile O.G. 4/1995 modificata si aprobata prin L 85/1995, precum si O.G. 41/2007 modificata si aprobata prin L 28/2009.**

Statia de prognoza si avertizare Piatra Neamt

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA  
OFICIUL FITOSANITAR NEAMT

## BULETIN DE AVERTIZARE

NR 59 DIN 24.06.2015

Conditiiile climatice din ultimile zile au favorizat aparitia si dezvoltarea bolii / daunatorului : **Rapan (Venturia inaequalis), Fainare (Podosphaera leucotricha), Monilioza (Monilinia fructigena), Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) G1T2, Paduchele verde (Aphis pomi), Paduchele lanos (Eriosoma lanigerum)**, care pot cauza pierderi importante la culturile : **MAR**

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **T8** pe parcelele pe care s-a depasit pragul economic de daunare: **Rapan, Fainare : GA - 10% pe frunze, Monilioza : frecv - 3% fructe atacate, Paduche verde : 30 afide/frunza, Paduchele din San Jose : 0,5 larve/ml ramura, Paduchele lanos : 10 lastari / pom cu atac**

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

**Systhane forte conc. 0,02% † Actara 25 WG conc. 0,01% sau**

**Stroby DF conc. 0,01 - 0,013% † Calypso 480 SC conc. 0,02%**

**Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea « Agricultura - Fitosanitar - baza de date Pestexpert ».**

Perioada optima de tratament : **iunie – decada 3, iulie - decada 1. 2015**

Fenofaza culturii : **fruct cu diametrul de 2,5 - 3,0 cm**

Alte recomandari :

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, si cele de protectie a albinelor si animalelor. **Se vor respecta prevederile O.G. 4/1995 modificata si aprobata prin L 85/1995, precum si O.G. 41/2007 modificata si aprobata prin L 28/2009.**

Statia de prognoza si avertizare Piatra Neamt

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
**Nr.60 din 24.06.2015**

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunătorului : *Rapan (Venturia pirina)*, *Patarea alba a frunzelor (Mycosphaerella sentina)*, *Monilioza (Monilinia fructigena)*, *Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) G1T2*, *Puricele melifer al parului (Psylla pyricola)*.

care pot cauza pierderi importante la culturile : **PAR**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **T8** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: *Rapan, Patare alba : GA - 10% pe frunze, Monilioza : frecv - 3% fructe atacate, Purice melifer : 3% lastari populati, Paduchele din San Jose : 0,5 larve/ml ram*

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

*Chorus 75 WG conc. 0,02 % † Actara 25 WG conc. 0,01% sau*

*Topsin 500 SC conc. 0,14% † Reldan 40 EC conc. 0,15%*

**Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea « Agricultura - Fitosanitar - baza de date Pestexpert ».**

Perioada optima de tratament : *iunie – decada 3, iulie - decada 1. 2015.*

Fenofaza culturii : *fruct cu diametrul de 2.5 - 3.0 cm*

Alte recomandari:

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, si cele de protectie a albinelor si animalelor. **Se vor respecta prevederile O.G. 4/1995 modificata si aprobata prin L 85/1995, precum si O.G. 41/2007 modificata si aprobata prin L 28/2009.**

Statia de prognoza si avertizare Piatra Neamt

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE  
AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA  
OFICIUL FITOSANITAR NEAMT

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
**NR 61 DIN 24.06.2015**

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunătorului: *Ciuruirea frunzelor (Coryneum beijerinckii)*, *Monilioza (Monilinia laxa)*, *Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) G1T2*, *Paduchele testos al prunului (Parthenolecanium corni) G1T2*, *Paduchele cenusiu (Hyalopterus pruni)*.

care pot cauza pierderi importante la culturile : **PRUN**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **T8** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: *Ciuruire : GA - 5% frunze, Monilioza : frecv - 3% fructe, Paduchele din San Jose : 0,5 larve/ml ram, Paduche cenusiu: 30 exemplare/frunza, Paduche testos : 0,5 larve /ml ram*

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

*Orius 25 EW conc. 0,75 – 0,01% † Reldan 40 EC conc. 0,15 % sau*

*Topsin 70 WDG conc. 0,07 % † Actara 25 WG conc. 0,01%*

**Produse fitosanitare similare puteti gasi consultand site-ul MADR sectiunea « Agricultura - Fitosanitar - baza de date Pestexpert ».**

Perioada optima de tratament : *iunie – decada 3, iulie - decada 1. 2015.*

Fenofaza culturii : *fruct cu diametrul de 2,5 – 3,0 cm*

Alte recomandari:

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, si cele de protectie a albinelor si animalelor. **Se vor respecta prevederile O.G. 4/1995 modificata si aprobata prin L 85/1995, precum si O.G. 41/2007 modificata si aprobata prin L 28/2009.**

Statia de prognoza si avertizare Piatra Neamt

